



ประเภท : บทความทางวิชาการ

หัวข้อข่าว : โรคพิษสุนัขบ้า

โดย : admin

ลงวันที่ : พุธที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

เข้าชม : 562

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส ไวรัส (Rabies) ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว ฯลฯ โรคนี้เมื่อเป็นแล้ว จะทำให้มีอาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง และถ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย ในปัจจุบันยังไม่มียาอะไรที่จะรักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้

คนติดโรคพิษสุนัขบ้าจากทางใดได้บ้าง?

คนเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ที่เป็นโรค คนสามารถติดโรคจากสัตว์เหล่านี้ได้ 2 ทาง คือ

1. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัด เชื้อไวรัสจากน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ถูกกัด
2. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลีย โดยปกติคนถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลีย จะไม่ติดโรคจากสัตว์เหล่านั้น นอกเสียจากว่าบริเวณที่ถูกเลียจะมีบาดแผลหรือรอยถลอก หรือรอยขีดข่วน โดยคนนั้น ไม่ได้สังเกต ในกรณีนี้ จะทำให้สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ รวมทั้ง ถูกเลียที่ริมฝีปาก หรือนัยน์ตา

คนที่ เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะมีอาการอย่างไร?

ในระยะ 2 - 3 วันแรก อาจมีไข้ต่ำๆ ต่อไปจะมีอาการเจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คันทหรือปวดแสบปวดร้อนตรงบริเวณแผลที่ถูกกัด ทั่วๆ ที่แผลอาจหาย เป็นปกติแล้ว ต่อไปจะมีอาการตื่นเต้นง่ายกระสับกระส่าย ไม่ชอบแสงสว่าง ไม่ชอบลม และไม่ชอบเสียงดัง กลืนลำบาก แม้จะเป็นของเหลวหรือน้ำ เจ็บมากเวลากลืน เพราะการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน แต่ยังมีสติพุดจารู้เรื่อง ต่อไปจะอะละอะมากขึ้น และสุดท้าย อาจมีอาการชัก เป็นอัมพาต หดสติ และเสียชีวิต เนื่องจาก ส่วนที่สำคัญของสมองถูกทำลายไปหมด

ข้อควรปฏิบัติภายหลังจากถูกสุนัขบ้า

หรือสัตว์ที่สงสัยว่าบ้ากัด.....

1. ล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาด ฟอกด้วยสบู่ 2 - 3 ครั้ง แล้วทาแผลด้วยน้ำยาฟิวดิน (เบตาดีน) หรือแอลกอฮอล์ หรือทิงเจอร์ ไอโอดีน แล้วรีบไปปรึกษาแพทย์ทันที
2. ถ้าสุนัขตายให้หาซากมาตรวจ ถ้าหากสุนัขไม่ตายให้ขังไว้ดูอาการ 10 วัน ขณะเดียวกันให้รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนการรักษาทางสมุนไพร หรือแพทย์แผนโบราณ ไม่สามารถป้องกันโรคได้ ไม่ควรรอดูอาการสุนัข เพราะอาจสายเกินไปที่จะฉีดวัคซีน
3. ในกรณีที่ติดตามสัตว์ที่กัดไม่ได้ เช่น เป็นสัตว์ป่า สัตว์จรจัด สัตว์กัดแล้วหนีไป หรือ จาสัตว์ที่กัดไม่ได้ จำเป็นต้องรับการฉีดวัคซีน
4. ผู้ที่ต้องมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คือ มีบาดแผล ไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนหรือมีเลือดไหล แผลถลอกหรือแผลลึก รวมทั้ง ผู้ที่ถูกสุนัขเลียที่นัยน์ตา ริมฝีปาก และผิวหนังที่มีแผลถลอก ส่วนในกรณีที่ถูกเลียผิวหนังที่ไม่มีแผลหรือเพียงแต่สัมผัสกับสุนัขไม่สามารถจะติดโรคได้ วัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เนื่องจากในปัจจุบันเราใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชนิดที่ทาจากเซลล์เพาะเลี้ยง (ฉีด 5 ครั้ง

เท่านั้น) เพราะมีประสิทธิภาพสูง ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ ต่อระบบประสาท และควรฉีดเสริมร่วมด้วย

ถ้าบาดแผลมีเลือดออกถูกเลียที่ริมฝีปากน้ำลายกระเด็นเข้าตา

สถานเสาวภาใช้โปรแกรมการฉีดวัคซีน

2 แบบ คือ

แบบปกติฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และแบบประหยัด

ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง แต่ละแบบจะได้รับการ ฉีดวัคซีน

ทั้งหมด 5 ครั้ง

เสริมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอย่างไร?

เสริมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นส่วนส่วนของน้ำใสของเลือดที่ได้จากม้า หรือคนที่ได้รับการฉีด

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ในเสริมจะมีโปรตีน ที่ทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า ในปริมาณ

ที่มากเสริมจะไปทำลายเชื้อไวรัส ในร่างกายของผู้ที่ถูกสุนัขกัด โดยการฉีดรอบๆ แผลก่อน ที่จะก่อ

โรค และก่อนที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายจะสร้างขึ้นด้วยเหตุนี้ การให้เสริมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับ

การฉีดวัคซีนเข็มแรก จึงเป็นวิธีที่จะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ผลดีที่สุดทุกวันนี้เวลาราชการ



ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้า

1. เมื่อถูกสัตว์กัด การฉีดวัคซีนกระตุ้นเพียง 1-2 เข็ม ร่างกายก็จะได้ภูมิคุ้มกันที่สูงพอจะป้องกันโรคอย่างได้ผล
2. ไม่เสี่ยงต่อการแพ้เซรุ่ม หรือเจ็บปวดจากการฉีดเซรุ่มรอบๆแผล

สัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะมีอาการอย่างไร? พบได้ 2 แบบ คือ

1. แบบดุร้าย มีอาการหงุดหงิด ไล่กัดคน และสัตว์อื่นๆ ถ้าถูกไข หรือกักขังไว้ในกรงจะกัดไขกรง หรือสิ่งของที่อยู่ใกล้อย่างดุร้าย

เมื่อแสดงอาการดุร้ายได้ 2 - 3 วัน ก็จะอ่อนเพลียลง ขาหลังไม่มีแรง เดินโซเซและ ตายในที่สุด

2. แบบเชื่องซึม มีอาการปากอ้าหุบไม่ได้ ลิ้นมีสีแดงคล้ำ บางครั้งมีสิ่งสกปรกติดอยู่และลิ้นห้อยออกมานอกปาก มีอาการคล้ายกระดูกติดคอ สุนัขจะเอาหน้าตะกุกบริเวณแก้มปากและคอขาว สุนัขจะลุกนั่ง ยืน และเดินไปมาบ่อยๆ